


外来(日帰り)手術を受けられる方へ

<p>外来から手術室</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外来より、そのままの服装で看護師と一緒に2階の手術室へ行き、更衣室にて手術着に着替えて頂きます。手術着の下にはシャツや上半身の下着は着用しないでください ・手術部位により下半身の衣服は着用したままでも良いですが、汚れる可能性もあります。ご了承ください ・お荷物は、更衣室のロッカーに入れて下さい ・*付き添いの方は、2階の談話室か外来のフロアにてお待ちください 						
<p>手術室へ入室</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・椅子に座り帽子を着用してお待ちください ・お名前・生年月日、手術部位(どこの手術か、左右どちらか)などの確認を行います ・同意書の確認をさせていただいた後、手術室へ入室していただきます ・部屋には見慣れない機械や天井には大きなライトがあります ・BGMを流しています ・専用のベッドに寝ていただきます、狭いので気をつけて下さい ・血圧計・心電図・指先クリップをつけさせていただきます ・血圧は手術終了まで、数分毎に測ります ・必要に応じて点滴をさせていただきます 						
<p>麻酔開始から手術終了まで</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・手術をする姿勢になります ・手術する部位によっては、足や腕の付け根に加圧式の止血バンドを巻きます ・麻酔の注射をします ※麻酔方法によって注射の場所や方法が異なります ・その後、麻酔の効き具合を確認します、チクチクするような痛みがあれば教えてください ・痛む時は麻酔を追加できますので、遠慮なくおっしゃってください ・手術中は触っている感じが残っていることがあります ・途中、気分が悪くなったり、変わったことがあれば、我慢しないで、おっしゃってください ・点滴のある方は基本的に抜きますが、しばらく点滴が必要な方は外来にて様子を観させていただきます <table border="1" data-bbox="172 1294 1501 1592"> <thead> <tr> <th>局所麻酔</th> <th>局所静脈麻酔</th> <th>伝達麻酔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手術をする部分に直接麻酔薬を注射することで手術部分の痛みを感じさせなくする麻酔です</td> <td>手術をする腕の付け根をバンドで締めて、腕全体に麻酔薬を効かせ手術部分の痛みを感じさせなくする麻酔です</td> <td>目的とする神経に直接、又はその周囲に、局所麻酔薬を注入し、感覚を麻痺させる麻酔です 手術中・術後は手術部位もしくはその辺りが重だるく、しびれた状態になります</td> </tr> </tbody> </table> <p>担当する手術室看護師が、そばにいます。声を掛けながら処置などを行わせて頂きますので心配事や不都合なことなどは何でも聞いてください</p>	局所麻酔	局所静脈麻酔	伝達麻酔	手術をする部分に直接麻酔薬を注射することで手術部分の痛みを感じさせなくする麻酔です	手術をする腕の付け根をバンドで締めて、腕全体に麻酔薬を効かせ手術部分の痛みを感じさせなくする麻酔です	目的とする神経に直接、又はその周囲に、局所麻酔薬を注入し、感覚を麻痺させる麻酔です 手術中・術後は手術部位もしくはその辺りが重だるく、しびれた状態になります
局所麻酔	局所静脈麻酔	伝達麻酔					
手術をする部分に直接麻酔薬を注射することで手術部分の痛みを感じさせなくする麻酔です	手術をする腕の付け根をバンドで締めて、腕全体に麻酔薬を効かせ手術部分の痛みを感じさせなくする麻酔です	目的とする神経に直接、又はその周囲に、局所麻酔薬を注入し、感覚を麻痺させる麻酔です 手術中・術後は手術部位もしくはその辺りが重だるく、しびれた状態になります					
<p>帰宅後</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・数時間後に麻酔が切れてくると、痛みが出てくる場合があります ・傷の状態によって抜糸までの期間は1~3週と異なります ですから、それまでの期間は必要に応じて消毒処置のため、通院して頂きます ・感染予防のため、必要に応じて抗生物質を内服していただきます ・抜糸までに創部を不潔にしたり、濡らしたりしないように注意してください ・当日はなるべく患部を心臓より上に挙げておいてください ・患部の安静については、主治医にご確認ください ・何か問題や気になる点がありましたら、病院へ連絡して下さい 						